



## HÁBITO ETILISTA COMO FATOR ASSOCIADO AO TABAGISMO EM GESTANTES ATENDIDAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DE MACEIÓ-AL

### *ALCOHOL USE AS A FACTOR ASSOCIATED WITH SMOKING IN PREGNANT WOMEN ATTENDING A PUBLIC HEALTH NETWORK IN MACEIÓ-AL: PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS*

*Thiago Marques Wanderley*

*Micaely Cristina dos Santos Tenório*

*Alane Cabral Menezes de Oliveira*

#### **Resumo:**

O consumo de bebidas alcoólicas, durante a gestação poderá implicar em repercussões diretas para o feto. Nesse sentido, tendo em vista os riscos e o impacto do tabagismo e do alcoolismo na gravidez, o presente estudo objetivou avaliar a relação entre hábito etilista e tabagismo em gestantes atendidas na rede pública de saúde de Maceió-AL. Estudo transversal realizado na rede pública de saúde do município de Maceió-AL, no ano de 2014. A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de um questionário padronizado que incluía dados socioeconômicos, estilo de vida e clínicos. Os resultados foram analisados com auxílio do programa estatístico SPSS por análise de Regressão de Poisson, com os resultados expressos em razões de prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), considerando-se significativo  $p < 0,005$ , sendo o tabagismo a variável desfecho das análises. Das 431 gestantes estudadas, 8,12% eram tabagistas. Ainda, das que fumavam 22,85% se autodeclararam negras; 94,2% tinham  $\geq 4$  anos de estudo; 34,3% eram solteiras; 66,6% apresentavam renda familiar mensal menor que um salário mínimo, 37,1% eram etilistas e 17,1% referiram trabalhar fora do lar. Quanto aos fatores associados ao tabagismo neste estudo, após análise ajustada permaneceu-se associado ao desfecho estudado a variável etilismo [RP=3,80; (IC95%= 1,93-7,47)  $p = 0,000$ ]. No presente estudo foi alta a prevalência de tabagismo em gestantes atendidas na rede pública de saúde e o fato da mulher consumir bebidas alcoólicas mostrou-se associado a esta condição.

**Palavras-Chave:** Gestação; Álcool; Tabagismo.

#### **Abstract:**

Drinking alcohol during pregnancy may have direct repercussions for the fetus health. In this sense, considering risks and impact of smoking and alcoholism on pregnancy, this study aims to evaluate the relationship between alcohol use and smoking in pregnant women attending the public health network of Maceió-AL. It is a cross-sectional study conducted at the public health network of Maceió-AL, in 2014. Data collection was performed by applying a standardized questionnaire that







Assim sendo, tendo em vista os riscos e o impacto do tabagismo e do alcoolismo na gravidez, o presente estudo objetivou avaliar a relação entre hábito etilista e tabagismo em gestantes atendidas na rede pública de saúde de Maceió-AL.

## 2 DESENVOLVIMENTO

### 2.1 METODOLOGIA

Estudo transversal realizado na rede pública de saúde do município de Maceió-AL, no ano de 2014, aprovado pelo Comitê de Ética (processo nº 390.131). Esse estudo é parte de uma pesquisa maior para o Sistema Único de Saúde (SUS) intitulada "Estado nutricional, ganho ponderal e comportamento alimentar de gestantes de Maceió Alagoas: impacto sobre a saúde do binômio mãe filho".

No período do estudo, a cidade de Maceió estava organizada estrategicamente em 8 distritos sanitários, com um total de 60 Unidades Básicas de Saúde (UBS). A seleção da população estudada se deu a partir do sorteio de 50% do total de UBS, por distrito sanitário, utilizando-se a listagem fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Todas as gestantes cadastradas em cada unidade sorteada compuseram a amostra, sendo que, aquelas unidades com mais gestantes cadastradas naturalmente contribuíram, proporcionalmente, com maior número de gestantes na amostra.

A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de um questionário padronizado que incluía dados socioeconômicos (idade, grau de escolaridade, renda, situação conjugal, trabalhar fora de casa, raça e nº de gestações), estilo de vida (etilismo e tabagismo) e clínicos (intercorrências durante a gestação).

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do pacote estatístico SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versão 20.0, sendo realizada Regressão de Poisson, com os resultados expressos em razões de prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), considerando-se significativo  $p < 0,005$  e a variável tabagismo sendo a variável desfecho das análises. E como variáveis independentes foram consideradas: idade materna, renda familiar mensal, nº de membros no domicílio, raça autodeclarada, etilismo, presença de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e aborto, ser primigesta e ser solteira.



