



I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAL



I INTERNACIONAL MEETING OF ORAL PATHOLOGY AND STOMATOLOGY OF ALAGOAS

II JORNADA ODONTOLÓGICA DA LIDOM

CANDIDA ALBICANS: FUNGO DA CÂNDIDA MAIS COMUM E MAIS PATOLÓGICO

Vanessa Silva de MOURA¹; Júlia de Araújo GOMES¹; Anne Myrelle da Cruz ANDRADE¹; Daniel Alves da SILVA¹; Luana Ranna Silva SANTOS¹; Lucas Mariz de Menezes TORRES¹; Danilo Cavalcante FERNANDES¹

vanessamoura37@gmail.com¹; juaraujogomes@hotmail.com¹;

annemyrelle18@gmail.com¹; danielzinho.15@outlook.com¹;

luanaranna2014@gmail.com¹; lucas-torres47@hotmail.com¹; drdcf.82@gmail.com¹

¹Centro Universitário Tiradentes – UNIT

A candidíase é uma infecção fúngica oportunista que pode manifestar-se nas mucosas oral e vaginal, podendo também desenvolver-se sistemicamente, na qual 90% das infecções são causadas pela *Candida albicans*. Geralmente é facilmente identificada por conter sintomas que podem ser notados cedo, sendo eles: presença de lesões brancas, aftas ou vermelhidão, que afetam a boca ou garganta. O diagnóstico é realizado pelo cirurgião-dentista, além disso, deve ser feito o acompanhamento do paciente e indicar a melhor forma de tratamento a ser seguida. Neste estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura que tem como objetivo proporcionar a síntese de conhecimento sobre as espécies existentes do fungo da *Candida*, visto que a *Candida Albicans* tem maior prevalência e é o tipo que mais acomete pacientes imunocomprometidos. Para busca dos artigos foi utilizada a base de dados Scielo. Para o levantamento dos artigos foram utilizados os descritores: Candidíase Bucal; Manifestações Bucais; Assistência odontológica para Crianças. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram: artigos publicados em português, publicados e indexados na referida base de dados, nos últimos cinco anos e que retratassem a temática em estudo. Para a seleção dos artigos foram lidos todos os títulos e selecionados aqueles que tinham relação com o objetivo do estudo. Dentre as espécies existentes do fungo da *Candida*, a *Candida Albicans* tem maior prevalência e é o tipo que mais acomete pacientes imunocomprometidos. Pacientes que apresentam imunidade baixa estão mais suscetíveis a desenvolverem a candidíase oral, uma vez que o sistema imune quando está enfraquecido por alguma razão, apresenta mais facilidade ao aparecimento de infecções oportunistas. O diagnóstico é realizado pelo cirurgião-dentista, que faz o acompanhamento do paciente e também indica a melhor forma de tratamento a ser seguida.

Palavras-chave: Candidíase Bucal; Manifestações Bucais; Assistência odontológica para Crianças.