



I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAL

I INTERNACIONAL MEETING OF ORAL PATHOLOGY AND STOMATOLOGY OF ALAGOAS



II JORNADA ODONTOLÓGICA DA LIDOM

TRATAMENTO ORTODÔNTICO PRÉ-ENXERTO EM PACIENTE COM FISSURA TRANSFORAME INCISIVO BILATERAL

Luciana Nascimento Madeiro de Oliveira¹; Estéfane Carvalho do Nascimento²;
Hibernon Lopes Filho³.

lucianamadeiro@hotmail.com¹; estefane.carvalho@outlook.com²;
hibernonlopes@hotmail.com³.

Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL¹

As fissuras labiopalatinas são malformações congênitas que se desenvolvem normalmente entre a 4^a e a 8^a semana de vida intrauterina e possuem várias classificações. A fissura transforame incisivo bilateral, particularmente, acomete lábio superior bilateralmente e palato completo até a úvula, dividindo a maxila em pré-maxila e dois segmentos palatinos. É o caso mais grave entre as fissuras, tendo geralmente maloclusão nos 3 planos do espaço. Devido a sua complexidade, a reabilitação do indivíduo acometido é interdisciplinar e inicia-se na primeira infância até a fase adulta. O caso a ser relatado trata de um paciente portador dessa anomalia que foi submetido a fase de pré-enxerto, adotando o protocolo de fases do tratamento ortodôntico do HRAC-USP com a finalidade de expansão maxilar, correção de sobremordida e preparo para a segunda fase da cirurgia de enxerto ósseo alveolar através do disjuntor palatal Hyrax modificado. Concluiu-se a importância do ortodontista no tratamento reabilitador de pacientes com fissura labiopalatina, visto que tendem a apresentar alterações no complexo maxilofacial.

Palavras-chave: fissura labiopalatina, pré-enxerto, expansão rápida da maxila.