



I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAL



I INTERNACIONAL MEETING OF ORAL PATHOLOGY AND STOMATOLOGY OF ALAGOAS

II JORNADA ODONTOLÓGICA DA LIDOM

AUMENTO DA FAIXA DE GENGIVA INSERIDA ATRAVÉS DE ENXERTO LIVRE: RELATO DE CASO CLÍNICO

Silana Nair Barbosa¹¹; Eduardo Marinho de Almeida Neto²¹; Ellen Rodrigues de Mendonça³¹; Jocélia de Souza Barrozo⁴¹; Maria Myrella Costa Franco⁵¹; Tarcísio Luiz Magalhães Ribeiro dos Anjos⁶¹; Thayslane Silva Guedes⁷¹.
silanabarbosa@hotmail.com¹; eduardo_marinho_@hotmail.com²;
ellen_airine@hotmail.com³; jocelia.barrozo@hotmail.com⁴; myrella.f@hotmail.com⁵;
tarcisioanjos@gmail.com⁶; thayslane_guedes@hotmail.com⁷.

Centro Universitário Tiradentes¹

A ausência de gengiva inserida ao redor de dentes e implantes é considerado um dos transtornos mais relevantes da clínica periodontal, uma vez que a falta do tecido queratinizado traz juntos incômodos na escovação e mastigação, interferindo na qualidade de vida do paciente, além de ser um fator de risco local para inflamação. Diante dessa condição um caso clínico com retrações múltiplas na região de incisivos inferiores, provocada por doença periodontal previa. A retração localizada no dente 31 ultrapassava a linha muco gengival tornando uma área de difícil acesso e de grande desconforto para a paciente. Foi planejado o enxerto gengival livre com o objetivo de restaurar a função normal do periodonto de proteção, e conseqüentemente devolver conforto e saúde gengival para o paciente. A técnica cirúrgica foi realizada através de aprofundamento do vestíbulo na região no transoperatório do enxerto desepitelização da gengiva inserida ao redor da retração principal, estabilização do enxerto de epitélio-conjuntivo na área receptora, através de princípios cirúrgicos minimamente invasivos.

Palavras-chave: Microcirurgia, Periodontia, Tecido Conjuntivo.