



I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAL

I INTERNACIONAL MEETING OF ORAL PATHOLOGY AND STOMATOLOGY OF ALAGOAS

II JORNADA ODONTOLÓGICA DA LIDOM



LUXAÇÃO LATERAL E AVULSÃO COM PERDA DEFINITIVA DO ELEMENTO DENTAL EM CRIANÇA DE 7 ANOS

Islane Caroline Ferreira da SILVA¹, Bárbara Thayllane da Silva SANTOS¹, Gabriela Freire ALVES¹, Renata Matos Lamenha LINS¹, Maria Clara Cavalcante CÂMPELO¹, Vívía Rodrigues AMORIM¹, Inês de Fátima Azevedo Jacinto INOJOSA²

karolineferreiraodonto@gmail.com, barbara.thayllane@hotmail.com,
gabriela.freire.alves@hotmail.com, renata-lamenha@hotmail.com,
mariaclaraccampelo@gmail.com, viviaamorim_13@hotmail.com,
inesjacyntho@uol.com.br

¹ *Discentes da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas (FOUFAL).*

² *Docentes da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas (FOUFAL).*

A ocorrência de traumatismo em dentes permanentes recém erupcionados, bem como a perda definitiva do elemento dental por avulsão em pacientes no período de dentição mista é um desafio para odontologia. O presente trabalho objetiva relatar um trauma de luxação lateral em dente recentemente erupcionado e uma avulsão com perda definitiva do elemento dental. Paciente com 7 anos de idade compareceu ao Projeto de Extensão Trauma Dental com ausência dos elementos 21 e 62 e luxação lateral do 11, associada à fratura de tábua óssea. O tratamento inicial baseou-se no reposicionamento do dente luxado, com redução da fratura óssea, associado ao uso de contenção serrigida. Devido ao estágio de desenvolvimento dentário, optou-se pelo acompanhamento clínico, radiográfico e tomográfico para análise da revascularização do dente 11, tendo sido observado no controle de 6 meses presença de obliteração do canal radicular sugestiva de metamorfose cálcica. Devido às ausências dentárias, foi confeccionada uma prótese parcial removível, tendo como planejamento pós eruptivo do dente 22 o tratamento ortodôntico e estético da região. Diante do exposto, conclui-se que o trauma na dentição mista requer tratamento multidisciplinar, necessitando de acompanhamentos periódicos para que se realize um tratamento adequado e promova a confiança na relação paciente.

Palavras-chave: Avulsão dentária; Calcificação dentária; Luxação dentária.