



I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAL



I INTERNACIONAL MEETING OF ORAL PATHOLOGY AND STOMATOLOGY OF ALAGOAS

II JORNADA ODONTOLÓGICA DA LIDOM

RESTABELECIMENTO ESTÉTICO-FUNCIONAL DE DENTES CONÓIDES E DENTES AUSENTES: UM RELATO DE CASO CLÍNICO

José Claudio Santos COSTA¹, Renata Matos Lamenha LINS¹, Maria Clara Cavalcanti CAMPÊLO¹, Amanda Alves Feitosa BATISTA¹, Mirelly Raianne de Lira TORRES¹, Larissa Silveira de Oliveira FRAGOSO¹.

claudiocostaodonto@gmail.com, renata-lamenha@hotmail.com,
mariaclaraccampelo@gmail.com, amanda_feitosa@hotmail.com,
mihtorres2@gmail.com, larissafragoso@yahoo.com.br

¹Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas

Nos casos de reabilitação oral, existem diversas opções em relação ao material restaurador e a técnica empregada. Portanto, aspectos relevantes devem ser ponderados durante e posteriormente a reabilitação, como: custo para o paciente, invasividade durante o procedimento e a longevidade do caso. Com isso, abordagens conservadoras têm sido os métodos de escolha atualmente. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso estético-funcional de reanatomização e substituição de dentes anteriores, utilizando as técnicas de resina composta direta e prótese adesiva, respectivamente. Paciente, gênero feminino apresentou-se a Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas, apresentando classe III de Angle, mordida cruzada bilateral, incisivos laterais superiores (12 e 22) com formato conóide, incisivos centrais superiores apresentando diferença de altura, posteriores ausentes e incisivos anteriores inferiores (41 e 31) ausentes. Diante da situação clínica do caso, foi possível obter um resultado satisfatório através da associação de técnicas de baixo custo, rápida execução, e primordialmente, preservando o máximo de tecido dental sadio. Entretanto, para uma completa reabilitação do caso, se faz necessário uma correção cirúrgica da oclusão (ortognática), subseqüentemente, um protocolo protético dos elementos posteriores ausentes.

Palavras-chave: Reabilitação oral, Dentes conóides, Estética.