



# I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAL



## I INTERNACIONAL MEETING OF ORAL PATHOLOGY AND STOMATOLOGY OF ALAGOAS

### II JORNADA ODONTOLÓGICA DA LIDOM

#### TATUAGEM POR AMÁLGAMA EM REBORDO ALVEOLAR

Analicia Costa SOARES<sup>11</sup>; Laís Morganna Marques de OLIVEIRA<sup>12</sup>; Jane Kelly MARQUES da Silva<sup>13</sup>; Romualdo Arthur Alencar CALDAS<sup>14</sup>; Catarina Rodrigues ROSA de Oliveira<sup>15</sup>; Sonia Maria Soares FERREIRA<sup>16</sup>; Camila Maria BEDER Ribeiro  
Girish panjwani<sup>17</sup>

analiciacsoares@gmail.com<sup>11</sup>; laismorganna@hotmail.com<sup>12</sup>; jane\_gomesf12@hotmail.com<sup>13</sup>; romcaldas@yahoo.com.br<sup>14</sup>; catarinarosaodonto@hotmail.com<sup>15</sup>; sonia.ferreira@cesmac.com.br<sup>16</sup>; cami.beder@gmail.com<sup>17</sup>

CESMAC

A tatuagem por amálgama, é uma pigmentação exógena, localizada no interior da mucosa oral. Pigmentos clinicamente evidentes, apresentando-se como máculas ou manchas. Ao analisar o exame intrabucal da paciente de gênero feminino, 64 anos observou-se a presença de uma mancha pigmentada em rebordo alveolar, com cerca de 2 cm. Radiograficamente, é radiopaca. Microscopicamente notam-se fragmentos de pigmentos acastanhados no interior de tecido conjuntivo ao redor de vasos. Não é necessário tratamento para esse tipo de lesão, a menos que seja por razão estética ou psicológica. É de suma importância o estudo de casos sobre tatuagem por amálgama, pois sua semelhança clínica pode ser confundida com outros tipos de lesões, é necessária uma anamnese cautelosa e assim definir o diagnóstico.

**Palavras-chave:** Amalgama, Pigmentação, Diagnóstico.